



Women Help Women



Bezpieczna aborcja przy użyciu Misoprostolu do 9 tygodnia ciąży

1


Nie powinnaś być sama! Ktoś bliski powinien być przy tobie na wypadek konieczności udania się do szpitala.



2


Potrzebujesz w sumie 12 tabletek Misoprostolu.

Włóż 4 tabletki Misoprostolu (po 200 mikrogramów każda, w sumie 800 mg) pod język i trzymaj je tam przez przynajmniej 30 minut. Nie połkaj od razu tabletek!




3

Po 3 godzinach włóż następne 4 tabletki Misoprostolu pod język i trzymaj je tam przez przynajmniej 30 minut.



4

Po kolejnych 3 godzinach włóż następne 4 tabletki Misoprostolu pod język i trzymaj je tam przez przynajmniej 30 minut.



Co będę czuć gdy aborcja rozpocznie się?



Skurcze
+
Krwawienie



Jakie mogą być skutki uboczne lekarstw?




Biegunka



Wymioty



Gorączka



Ból głowy



Kiedy powinnam iść do lekarza lub na pogotowie?



Silne krwawienie:
Zużywasz więcej niż 2
podpaski typu "maxi"
przez dłużej niż 2 godziny



Wysoka gorączka:
Wyższa niż 38° lub 38°
utrzymująca się przez
więcej niż 24 godziny



Silny ból:
Przez dłużej niż kilka
godzin

Potrzebujesz dalszej pomocy? Odwiedź stronę www.womenhelp.org
Lub napisz do info@womenhelp.org