



Women Help Women

Aborto seguro con Misoprostol

Para embarazos de hasta 9 semanas





1.

¡No debes estar sola! Debe haber alguien contigo por si necesitas ir a un hospital.





2.

Vas a necesitar 12 pastillas de Misoprostol. Para empezar, coloca 4 pastillas de Misoprostol debajo de la lengua y déjalas por lo menos 30 minutos




3.

3 horas después, coloca otras 4 pastillas de Misoprostol debajo de la lengua y déjalas por lo menos 30 minutos.



4.

Después de otras 3 horas, coloca otras 4 pastillas de Misoprostol debajo de la lengua y déjalas por lo menos 30 minutos.



¿Qué voy a sentir cuando comience el aborto?



Calambres o
cólicos

+

Sangrado



¿Qué efectos secundarios de las pastillas podría sentir?




Diarrea



Vómitos



Fiebre




Dolor de
cabeza



¿Cómo puedo saber si tengo que ir al hospital?



Pérdida abundante de sangre:
Más de 2 toallas sanitarias
grandes en una hora por más de
2 horas seguidas.



Fiebre alta:
Más de 38° por
más de 24 horas.



Dolor intenso:
Por más de unas
pocas horas.

Para más información visita: www.womenhelp.org
O envía un correo electrónico a: info@womenhelp.org