



### EFFICACITÉ

#### DES MEDICAMENTS

La méthode combinée Mifepristone / Misoprostol est sûre et efficace dans 95 à 98% des cas durant les 10 premières semaines de grossesse.

### QUE FAIRE SI

#### L'AVORTEMENT

#### N'A PAS EU LIEU?



La femme peut répéter la prise du médicament ou recourir à une aspiration. Il y a très peu de risques de malformations du fœtus si la grossesse continue après la prise du médicament.



### MON AVORTEMENT A-T-IL RÉUSSI ?

Même si la femme sent qu'elle n'est plus enceinte, il est important de s'assurer que l'avortement a réussi. Il faut faire une échographie après l'avortement médicamenteux, ou un test de grossesse 3 à 4 semaines après l'avortement.



### APRÈS L'AVORTEMENT



Après l'avortement, une femme peut continuer à saigner légèrement pendant 1 à 3 semaines, mais chaque femme est différente. Il faut confirmer que l'avortement est réussi.



Il ne faut rien introduire à l'intérieur du vagin (tampons), ni prendre de bain ou avoir des relations sexuelles jusqu'à ce que les saignements abondants diminuent, environ 2 jours après l'avortement médicamenteux.



**Une femme peut tomber enceinte immédiatement après un avortement!**

Pour éviter de retomber enceinte immédiatement, si elle ne le souhaite pas, il faut utiliser un bon moyen de contraception.



### CONTACTS

Women Help Women

WEB: [HTTPS://WOMENHELP.ORG/](https://womenhelp.org/)

EMAIL: [INFO@WOMENHELP.ORG](mailto:info@womenhelp.org)

TWITTER: [@WOMENHELPORG](https://twitter.com/womenhelporg)

FACEBOOK: [WOMENHELPWOMENINTERNATIONAL](https://www.facebook.com/womenhelpwomeninternational)

MAMA Network

MOBILIZING ACTIVISTS around MEDICAL ABORTION (MAMA).

# AVORTEMENT MEDICAMENTEUX

AVEC MIFEPRISTONE  
PLUS MISOPROSTOL  
(METHODE COMBINEE)





### COMMENT CA MARCHE ?

Le Misoprostol induit un processus similaire à une fausse couche.



**MIFEPRISTONE** **MISOPROSTOL**  
La Mifepristone bloque la progestérone, une hormone indispensable pour que la grossesse se poursuive, et permet à l'utérus d'être plus réceptif au Misoprostol.



Le Misoprostol provoque des contractions de l'utérus, qui causent l'expulsion des tissus de la grossesse, de caillots et des saignements.

### JUSQU'À QUAND PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ POUR UN AVORTEMENT SÛR ?



0 >>> 10 weeks

Dans les 10 premières semaines de la grossesse en comptant depuis le premier jour des dernières règles.



### COMMENT UTILISER LES MÉDICAMENTS POUR UN AVORTEMENT SÛR ?



La femme aura besoin d'un (1) comprimé de Mifepristone 200 mcg et quatre (4) comprimés de Misoprostol de 200 mcg chacun



**La Mifepristone** doit être avalé avec un verre d'eau.

24 heures plus tard, placer **4 comprimés de Misoprostol** par voie buccale



entre la gencive et la joue, **deux comprimés du côté gauche entre la gencive et la joue et deux comprimés du côté droit entre la gencive et la joue.**

**Les 4 comprimés doivent être gardés dans la bouche** durant 30 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dissous. Après ce temps, la femme peut avaler les restes



### POSSIBLES EFFETS SECONDAIRES

Dans les 24 heures après la prise des médicaments, les symptômes suivants peuvent survenir: nausées, vomissements, diarrhée, fièvre de 38°, maux de tête et/ou malaises. Ces effets secondaires ne sont pas dangereux et disparaîtront après quelques heures.



### QUE PEUT-IL SE PASSER APRES LA PRISE DU MISOPROSTOL ?



De fortes crampes et des saignements plus importants que ceux des règles.



Dans 90% des cas, **l'expulsion de la grossesse** se fait dans les premières 24 heures.



Plus la femme a une grossesse avancée, plus elle aura des saignements.



La femme peut prendre de l'**Ibuprofen** ou du **panadol** pour soulager la douleur.



### QUELS SONT LES SIGNES DE COMPLICATIONS ?



Saignements excessifs (2 à 3 serviettes hygiéniques remplies par heure pendant plus de 2 à 3 heures de suite)



Forte fièvre (plus de 39°), ou 38° pendant plus de 24 heures



Fortes douleurs qui ne disparaissent pas malgré les antidouleurs et persistent plusieurs jours après la prise des médicaments.



Pertes vaginales anormales et malodorantes

### QUE FAIRE EN CAS DE COMPLICATIONS ?



**Se rendre à un centre de santé immédiatement.**

Si une femme a besoin de soins médicaux, **le personnel de santé est obligé de la prendre en charge.** Les traitements des complications d'un avortement médicamenteux sont exactement les mêmes que ceux d'une fausse couche. **Il est impossible de faire la différence entre une fausse couche et un avortement avec mifepristone et misoprostol.** La femme peut donc dire qu'elle a eu une fausse couche.