



# Women Help Women



Avortement sûr avec du Misoprostol  
Pour une grossesse jusqu'à 9 semaines de gestation


1.

Ne soyez pas seule ! Soyez accompagnée au cas où vous devez aller à l'hôpital.




2.

Mettez 4 comprimés de Misoprostol sous la langue pendant au moins 30 minutes.





3.

Trois heures plus tard, mettez 4 autres comprimés de Misoprostol sous la langue pendant au moins 30 minutes.



4.

Encore trois heures plus tard, mettez 4 autres comprimés de Misoprostol sous la langue pendant au moins 30 minutes.



## Que vais-je sentir quand l'avortement commencera?



Crampes

+

Saignements



## Quels effets secondaires les comprimés peuvent-ils avoir?



Diarrhée



Vomissement



Fièvre



Mal de tête



## Comment est-ce que je sais si je dois aller à l'hôpital?



**Perte de Sang:**  
Plus de 2 serviettes par  
heure durant plus de 2  
heures



**Fièvre Elevée:**  
Plus de 39 ou plus de 38  
durant plus de 24 heures



**Douleurs Sévères:**  
Pendant plus que  
quelques heures

Avez-vous besoin de plus d'aide ? Rendez-vous sur

[www.womenhelp.org](http://www.womenhelp.org)

Ou par email: [info@womenhelp.org](mailto:info@womenhelp.org)