

الاجهاض الـآمنة بـ ميسـتوبـرول للحمل ما قبل الـأسبوع الـعاشـر



1

لا تكوني بوحدة! من المهم أن تكون معك شخصـة يـمكن أن تـساعدك في حالة الطارئ التي تحتاج إلى مساعدة المسـتشفى أو الطـبيب





2

ضعي 4 حبات (وكل واحد لـ 200 ميليغرام، وكلها مع بعض تساوي 800 ميليغرام) من دواء "ميسـتوبـرول" تحت لسانك واتركيها هناك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ولاتبتلعيها قبل ذلك.





3

بعد ذلك بـ 3 ساعات و ضعـي 4 حبات جديدة تحت لسانك واتركيها هناك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.



4

بعد ذلك بـ 3 ساعات و ضعـي 4 حبات جديدة تحت لسانك واتركيها هناك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.



ما الذي س أحس به لما يبدأ الإجهاض؟



شد العضلي

+

النزف



ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة التي يمكن أن أحس بها بسبب الدواء؟



الإسهال



التقيؤ



السخونة



وجع رأس




كيف أعرف لما من اللازم أن أذهب إلى
المستشفى؟



النزف الشديد:

أنت تستخدمي أكثر من
ضمانيت في ساعة واحدة عبر
مدة ساعتين



السخونة الشديدة:

درجة الحرارة أكثر من 38⁰ أو
تبقى على 38⁰ لمدة أطول من
2 ساعة



الألم الشديد:

لمدة أطول من بعض الساعات

هل تريد المزيد من المعلومات؟ إذهبي إلى موقع

www.womenhelp.org

Images provided by Hesperian